


LIRAGLUTIDE




* Een zeer hoog risico op HVZ wordt gedefinieerd als:

1. Eerder bewezen HVZ; en/of
2. Chronische nierschade

1: Metformine en het sulfonyleureumderivaat dienen in de maximaal verdraagbare dosering gebruikt te worden. Bij een intolerantie kan de maximaal verdraagbare dosering dus 0 mg zijn. In dat geval moet het middel wel zijn geprobeerd in het verleden.

2: Er bestaat vergoeding voor gebruik in combinatie met andere anti-diabetica, waaronder SGLT2-remmers, behalve in combinatie met een DPP4-remmer.

GLP1-agonisten: SEMAGLUTIDE, DULAGLUTIDE En EXENATIDE




* Een zeer hoog risico op HVZ wordt gedefinieerd als:

1. Eerder bewezen HVZ; en/of
2. Chronische nierschade

1: Metformine en het sulfonylureumderivaat dienen in de maximaal verdraagbare dosering gebruikt te worden. Bij een intolerantie kan de maximaal verdraagbare dosering dus 0 mg zijn. In dat geval moet het middel wel zijn geprobeerd in het verleden.
2: Er bestaat vergoeding voor gebruik in combinatie met andere anti-diabetica, waaronder SGLT2-remmers, behalve in combinatie met een DPP4-remmer. Bij exenatide geldt dat enkel Bydureon® is geregistreerd voor deze indicatie, Byetta® niet.

GLP1-agonisten: LIXISENATIDE



* Een zeer hoog risico op HVZ wordt gedefinieerd als:

1. Eerder bewezen HVZ; en/of
2. Chronische nierschade

1: Metformine en het sulfonyleureumderivaat dienen in de maximaal verdraagbare dosering gebruikt te worden. Bij een intolerantie kan de maximaal verdraagbare dosering dus 0 mg zijn. In dat geval moet het middel wel zijn geprobeerd in het verleden.